# مرض الحمى القلاعية


# مرض الحمى القلاعية



المرض

مرض الحمى القلاعية هو مرض يصيب الأبقار. الأغنام. الماعز الخنازير كذلك الحيوانات مشقوقة الظلف (مثل الغزلان الظباء و الجواميس) ما يتسبب في ظهور بثورا أساسا على الفم والقدمين. من العوارض التي تظهرها الحيوانات المصابة الصعوبة في التحرك. الحمى. الاكتئاب. العرج، فقدان الشهية بسبب الألم. كذلك التراجع في إنتاج الحليب. و قد لوحظ أيضا كثرة إفراز اللعاب عند الأبقار.

لكن ذلك لا يمنع حدوث الوفاة عند صغار الخنازير و المجترات الصغيرة دون ظهور بثور أو أي عوارض أخرى، في بعض الحالات، هنالك إمكانية حدوث



الإنتقال

المسرض

الأغنام. الماعز. الخنازير كذلك الحيوانات مشقوقة الظلف (مثل الغزلان الظباء و الجواميس) ما يتسبب في ظهور بثورا أساسا على الفم والقدمين. من العوارض التي تظهرها الحيوانات المصابة الصعوبة في التحرك، الحمى، الاكتئاب، العرج. فقدان الشهية بسبب الألم، كذلك التراجع في إنتاج الحليب، و قد لوحظ أيضا كثرة إفراز اللعاب عند الأبقار،

مرض الحمى القلاعية هو مرض يصيب الأبقار.

لكن ذلك لا يمنع حدوث الوفاة عند صغار الخنازير و المجترات الصغيرة دون ظهور بثور أو أي عوارض أخرى، في بعض الحالات، هنالك إمكانية حدوث

### الإنتقال



تعد الحمى القلاعية واحدة من أكثر الأمراض المعدية، و من أهم طرق انتقال العدوى الاحتكاك و الاختلاط ما بين الحيوانات كما أن الأكل. الروث. التجهيزات، العربات و الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الحيوانات المصابة يمكن أن يساهموا أيضا في نقل الفيروس. بالإضافة إلى إمكانية انتقال العدوى من خلال الخليب. اللحوم و غيرها من منتجات الحيوانات المصابة.

كما يجدر الإشارة إلى إمكانية انتقال المرض

تزيد السلوكيات و التصرفات الحفوفة بالخاطر من

احتمال انتشار المرض. تعد أغلب وسائل الوقاية من

هذه العدوى مشتركة مع أمراض أخرى و تعتبر إذن

لحماية القطيع من هذه العدوى عند ظهور بعض

هذه الوسائل الأنجع و الأقل تكلفة.

### الوقساية


العزل

والتطهير



- مشاركة الحيوانات من قطعان مختلفة (على سبيل المثال في المراعي الإتصال من خلال الأنوف عبر الحواجز)؛







البؤر وجب

- حظيرة خاصة لعزل و مراقبة كل حيوان جديد تم شراؤه حديثا لمدة 14 يوما؛
  - البذل و الوسائل الواقية للأحذية للزوار
  - تطهير و تعقيم القدم عند مدخل الحظيرة.

إن اللقاحات ضد مرض الحمى القلاعية متوفرة ويجب الستخدامها وفقا لتعليمات هيئة الخدمات

المصالح البيطرية بكل حالة مشتبه بإصابتها

بالحمى القلاعية. هذا الإشعار إلزامي وضروري



الوقاية



العزل والتطهير



المعدية، و من أهم طرق انتقال العدوى الاحتكاك و الاختلاط ما بين الحيوانات كما أن الأكل. الروث. التجهيزات. العربات و الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الحيوانات المصابة يمكن أن يساهموا أيضا في نقل الفيروس، بالإضافة إلى إمكانية انتقال العدوى من خلال الحليب. اللحوم و غيرها من منتجات الحيوانات المصابة.

تعد الحمى القلاعية واحدة من أكثر الأمراض

كما يجدر الإشارة إلى إمكانية انتقال المرض

تزيد السلوكيات و التصرفات الحفوفة بالخاطر من احتمال انتشار المرض، تعد أغلب وسائل الوقاية من هذه العدوى مشتركة مع أمراض أخرى و تعتبر إذن هذه الوسائل الأنجع و الأقل تكلفة.

لحماية القطيع من هذه العدوى عند ظهور بعض

- مشاركة الحيوانات من قطعان مختلفة (على سبيل المثال في المراعي الإتصال من خلال الأنوف عبر الحواجز)؛
  - زيارة المزارع الأخرى؛
- تبادل الحيوانات كذلك الأفراد والتشارك أو إقتسام الأدوات والمركبات مع المزارع الأخرى.

- حظيرة خاصة لعزل و مراقبة كل حيوان جديد تم شراؤه حديثا لمدة 14 يوما؛
  - البذل و الوسائل الواقية للأحذية للزوار تطهير وتعقيم القدم عند مدخل الخظيرة.

إن اللقاحات ضد مرض الحمى القلاعية متوفرة ويجب الستخدامها وفقا لتعليمات هيئة الخدمات

### لمزيد من المعلومات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

هاتف: 0537676505 (+212) أو (+212) 0537676506

فاكس: 053777216 (+212+) موقع الواب: |http://www.onssa.gove.me



### لمزيد من المعلومات قد يتسبب هذا المرض في خسائر اقتصادية المكتب الوطني للسلامة الصحية مختلفة منها المباشرة وغير المباشرة مما يعرض للمنتجات الغذائية القطيع للخطر لذلك التحقق بانتظام من هاتف: 0 N S S A أو +212) (+212) أو سلامة الحيوانات مهما جدا. كما يجب إعلام

(+212) 0537676506 فاكس: 053777216 (+212+)

موقع الواب: /http://www.onssa.gove.me



قد يتسبب هذا المرض في خسائر اقتصادية مختلفة منها المباشرة وغير المباشرة مما يعرض القطيع للخطر، لذلك التحقق بانتظام من سلامة الخيوانات مهما جدا. كما يجب إعلام المصالح البيطرية بكل حالة مشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية، هذا الإشعار إلزامي وضروري للحد من انتشار المرض.

للحد من انتشار المرض.



## FIÉVRE APHTEUSE



## FIÉVRE APHTEUSE


### Maladie



La fièvre aphteuse est une maladie des bovins, ovins, caprins, porcins et autres animaux à sabots fendus (par exemple, cerfs, antilopes , buffles ) qui provoque des aphtes principalement sur la bouche et les pieds. Les animaux infectés sont réticents à se déplacer et ont de la fièvre, sont déprimés, boitent, perdent l'appétit à cause de la douleur et produisent moins de lait. Une grosse salivation est observée chez les bovins.

La mort peut survenir chez les porcelets, les agneaux et les chevreaux sans aphtes ou d'autres signes. L'avortement peut se produire.

Maladie



La fièvre aphteuse est une maladie des bovins, ovins, caprins, porcins et autres animaux à sabots fendus (par exemple, cerfs, antilopes, buffles) qui provoque des aphtes principalement sur la bouche et les pieds. Les animaux infectés sont réticents à se déplacer et ont de la fièvre, sont déprimés, boitent, perdent l'appétit à cause de la douleur et produisent moins de lait. Une grosse salivation est observée chez les bovins.

La mort peut survenir chez les porcelets, les agneaux et les chevreaux sans aphtes ou d'autres signes. L'avortement peut se

### **Transmission**



La fièvre aphteuse est une des maladies les plus contagieuses. Le contact entre les animaux est le principal mode de transmission et la propagation de la maladie, mais aussi la nourriture, la literie, l'équipement, les véhicules et les personnes qui ont été en contact avec des animaux infectés peuvent transmettre le virus. La transmission par le lait, la viande et d'autres produits d'animaux infectés est possible. La transmission aérienne peut se produire.

Les comportements à risque augmentent

la probabilité d'infection. La plupart des

mesures de prévention sont communes à

plusieurs maladies et sont le moyen le

meilleur et le plus économique de

Pour protéger le troupeau lorsque des

- Les contacts entre animaux de différents

troupeaux (par exemple sur les pâturages,

le contact nez à nez à travers les clôtures;

- Partage des animaux, des outils, des

véhicules, du personnel avec d'autres

foyers sont suspectés à proximité:

protéger le troupeau.

- Visiter d'autres élevages;

### **Transmission**



La fièvre aphteuse est une des maladies les plus contagieuses. Le contact entre les animaux est le principal mode de transmission et la propagation de la maladie, mais aussi la nourriture, la literie, l'équipement, les véhicules et les personnes qui ont été en contact avec des animaux infectés peuvent transmettre le virus. La transmission par le lait, la viande et d'autres produits d'animaux infectés est possible. La transmission aérienne peut se produire.

Les comportements à risque augmentent

la probabilité d'infection. La plupart des

mesures de prévention sont communes à

plusieurs maladies et sont le moyen le

meilleur et le plus économique de

Pour protéger le troupeau lorsque des

- Les contacts entre animaux de différents

troupeaux (par exemple sur les pâturages,

le contact nez à nez à travers les clôtures;

- Partage des animaux, des outils, des

véhicules, du personnel avec d'autres

foyers sont suspectés à proximité:

protéger le troupeau.

- Visiter d'autres élevages;

Éviter:

### **Prévention**












### Réaliser:

exploitations.


Éviter:



- Couvre-chaussures jetables et biocostume pour les visiteurs;
- Désinfectant pédiluve à l'entrée de

Les vaccins contre la fièvre aphteuse sont disponibles et doivent être utilisés conformément aux instructions des services vétérinaires.

### **Prévention**









- pendant 14 jours tout nouvel animal - Couvre-chaussures jetables et bio-
- costume pour les visiteurs;
- Désinfectant pédiluve à l'entrée de

Les vaccins contre la fièvre aphteuse sont disponibles et doivent être utilisés conformément aux instructions des services vétérinaires.

La maladie peut provoquer différentes

pertes économiques directes et indirectes

### Sensibilisation

Office national de securite sanitaire de produits alimentaires



05 37 77 72 16 Site wb: http://www.onessa.gove.ma/







La maladie peut provoquer différentes pertes économiques directes et indirectes et votre troupeau peut être à risque. Il est très important de vérifier régulièrement tous les animaux. Toute suspicion de fièvre aphteuse doit être notifiée immédiatement au Service vétérinaire.

La notification est obligatoire et est essentiel pour limiter la propagation de la

### Sensibilisation

Office national de securite sanitaire de produits alimentaires

Tel/Fax: (+212) 05 37 67 65 05-06 / 05 37 77 72 16





essentiel pour limiter la propagation de la